

# Epidemia Covid-19

## Biolimpieza de la Unidad hospitalaria móvil (UMH) después del transporte

Versión 1 – 09 de marzo 2020

### PROTECCIÓN DEL PERSONAL

- El agente que realiza la biolimpieza de la UMH debe portar un equipo de protección individual (EPI):
  - mascarilla quirúrgica
  - protección para la cabeza: gorro, cobertor, ...
  - bata impermeable de un solo uso (SU) de manga corta o bata impermeable SU de manga larga + un delantal plástico en caso de actividad húmeda
  - guantes de un solo uso

### BIOLIMPIEZA DE LA UMH

- Los procedimientos habituales de biolimpieza se deben respetar de forma estricta para el tratamiento de la UMH y del material reutilizable.
- Ventilar la UMH durante 15 minutos, si es posible.
- Utilizar un producto conforme con las normas para virucidas (EN 14476).
- Respetar el tiempo de contacto recomendado por el fabricante.
- Eliminar los desechos y los EPI en la red DASRIA.

<b>Dispositivos médicos o material sumergible</b>	Estetoscopio, gafas protectoras, ...	Detergente desinfectante para los dispositivos médicos (DM): tipo Anios Clean Excel D® <i>Dilución: 25 ml en 5 L de agua</i> Dejar en remojo 15 minutos, luego enjuagar
<b>Dispositivos médicos o material no sumergible</b>	Todo el material utilizado o tocado durante la intervención: equipos de observación, respirador, camilla, ...	Detergente desinfectante para superficies: tipo Surfa'safe Premium® : <i>aerosol listo para usar</i> o Surfanios Premium® : <i>20 ml en 8 L de agua (o 5 ml en 2 L de agua)</i>  No enjuagar y respetar el tiempo de contacto: esperar el secado completo
<b>Célula UMH</b>	Suelos y superficies	Surfanios Premium® : <i>20 ml en 8 L de agua (o 5 ml en 2 L de agua)</i>  No enjuagar y respetar el tiempo de contacto: esperar el secado completo

### BIOLIMPIEZA DEL RESPIRADOR

- Utilizar sistemáticamente un filtro en la salida respiratoria
- Después del uso: eliminar y cambiar todas las piezas de un solo uso: filtros, válvulas, sensores, circuitos ...
- Limpiar y desinfectar toda la superficie del respirador con un producto detergente desinfectante para Surfa'safe Premium® aerosol listo para usar)

### EN TODAS LAS SITUACIONES

Respetar las precauciones estándar, incluidas las relativas a la biolimpieza, en especial:

- Uso de guantes y delantal para cualquier contacto con desechos, ropa sucia o líquidos biológicos.
- Desinfección de las manos por fricción hidroalcohólica después de retirarse los guantes y al finalizar la biolimpieza.
- Evitar tocarse la cara durante la biolimpieza

## TEXTOS DE REFERENCIA

- *Avis relatif au traitement du linge, au nettoyage d'un logement ou d'une chambre d'hospitalisation d'un patient cas confirmé à SARS-CoV-2 et à la protection des personnels. HCSP 18 de febrero 2020.*
- *Le tri des déchets DASRIA/DMA – recommandations du CLIN Central AP-HP 2019*

REDACCIÓN	VALIDATION	APROBACIÓN
SOUYRI Valérie Servicio de Prevención de Riesgos Infecciosos- Sede APHP <i>Firma del original en papel</i>  Fecha de redacción: 09 de marzo 2020	Dr. FOURNIER Sandra Servicio de Prevención de Riesgos Infecciosos-Sede APHP <i>Firma en copia impresa original</i>  Fecha de validación: 09 de marzo 2020	Christine GUERI Directora del departamento Calidad Asociación con el paciente Sede APHP <i>Firma del original en papel</i>  Fecha de aprobación: 09 de marzo 2020
<b>Destinatarios:</b>	<i>Equipos operacionales de higiene, Presidentes de CLIN, Directores de Calidad</i>	