Logigramme de prise en charge en EMS de patients infectés par le Coronavirus SARS-CoV-2

0 cas avéré

Anticiper et se préparer au risque épidémique
renvoi à la Check list

- ✓ Activer la cellule de crise
- ✓ Arrêter les visites et respecter le confinement national
- ✓ Respecter les gestes barrières et Respecter les précautions standard
  - Renforcer l'hygiène des mains des résidents
- ✓ Surveiller les signes cliniques évocateurs de Covid19 ***renvoi aux signes cliniques****
- ✓ Respecter la distanciation sociale pour les repas et les autres activités
- ✓ Limiter les activités communes, privilégier les prises en charge restreintes voire individuelles

Dès le 1er cas Symptomatique
=

**** signes cliniques*** qui doivent faire évoquer sans attendre une infection Covid-19 :

- ✓ Une diarrhée ou des vomissements
- ✓ Un changement brutal de l'état de santé par rapport à l'état habituel (avec confusion ou chutes par exemple)
- ✓ Un fébricule avec variations de température d'un moment à l'autre avec oscillations entre hyper et hypothermie, nécessitant de prendre plusieurs fois la température dans la journée
- ✓ Une instabilité hémodynamique
- ✓ Une lymphopénie

Indépendamment des signes plus typiques chez les autres patients : signes d'infection respiratoire de type toux, dyspnée, et fièvre.

- ✓ Symptomatologie évocatrice de Covid19 ***renvoi aux signes cliniques*,***
- ✓ Mettre en place les précautions complémentaires Contact et Gouttelettes, le résident reste en chambre :
  - Pour tout soin au résident : port du masque chirurgical par le soignant
  - En face à face, port du double masque Résident/Soignant
  - Surblouse à usage unique, lunettes de protection
  - Tablier usage unique/gants selon Précautions standard
- ✓ Disposer les EPI devant la porte de la chambre ou dans un local proche Poser une signalétique éventuelle + affiche habillage/ déshabillage sur la porte de la chambre
- ✓ Si prélèvement naso-pharyngé, soins d'aspiration ou kiné respiratoire : port d'appareil de protection respiratoire FFP2
- ✓ Mettre solution hydro-alcoolique et boite de gants dans la chambre
- ✓ Appeler le médecin traitant/coordonnateur pour CAT et diagnostic
- ✓ Surveiller les signes de gravité, si présents appeler le 15
- ✓ Servir les repas en chambre pour tous
- ✓ Aérer la pièce, porte de chambre fermée
- ✓ Respecter les protocoles précautions Contact et Gouttelettes pour la gestion du linge, des déchets, des *excreta*, et l'entretien locaux

Cas avéré

Cas infirmé → Précautions standard ± Gouttelettes si signes respiratoires

1 cas avéré

- ✓ En cas de chambre double, séparer le cas avéré et le cas exposé. En l'absence de symptomatologie clinique pour le cas exposé, seules les précautions standard s'appliquent
- ✓ Réaliser les soins de manière groupée par un professionnel ou un binôme (Toilette, repas, entretien de l'environnement)
- ✓ Réaliser un signalement externe IRA

2-3 cas avérés

- ✓ Etudier la faisabilité de regroupement des cas au sein d'une même unité géographique (brancardage, entretien des locaux, effets personnels)
- ✓ **Privilégier l'organisation et la prise en charge par une équipe dédiée**
- ✓ **Sinon organiser de manière chronologique les soins avec prise en charge distincte des cas et des indemnes**

Edité le 26 mars 2020