

GAUDRY Stéphane  
MONTRAVERS Charles philippe  
RICARD Jean damien

### **1/ REGLAGES**

- Débit sang : 150 ml/min
- PPS (« Pré Pompe Sang », hémodilution préfiltre) : 200 ml/h
- Débit de dialysat :
  - 5000 ml/h
  - Ou 7800 ml/L si : Hyperkaliémie, Urée > 30 mmol/L, Acidose métabolique (Bicar <15 mmol/L), syndrome de lyse, Poids > 100 Kg

### **2/ DIALYSAT**

**Phoxilium** en première intention

*Indications à l'utilisation d'Hemosol B0: Hyper K  $\geq$  6 mmol/l ; Hyper K avec signe ECG ; Hyper K dans un contexte de syndrome de lyse*

### **3/ FREQUENCE ET DUREE**

- **Durée et fréquence des séances**

6 à 12 h quotidiennes, minimum de 8 h si

- Hypercatabolisme (choc septique)
- Acidose lactique sévère
- Hyperkaliémie
- Syndrome de lyse
- Obésité

- **Minimum d'EER à réaliser :**

Hémodialysé chronique : 4-6 h x3/sem

Hémodialyse pour IRA : 4-6 h/48h

- **Diminuer la durée et/ou la fréquence en cas de signes de « sur dialyse » et pas de nécessité de déplétion**

Hypokaliémie, hypophosphorémie, urée <15 mmol/l

- **Si l'indication de la séance est principalement une déplétion** mettre un débit dialysat faible (2-3 L/h) voire à zéro en l'absence de désordre métabolique ou d'urémie >15 mmol/l