

EVOLUTION DES PRECAUTIONS GOUTTELETTES ET CONTACT CHEZ UN PATIENT ATTEINT DE COVID-19

**Important : le passage à la phase suivante nécessite 48h sans fièvre ni dyspnée
(température ≤ 37.8 °C et amélioration nette de l'état respiratoire : besoin en O2 ≤ 2L/mn pour maintenir une SaO2 au repos ≥ 95%)**

Forme grave de Covid-19, sortie de réanimation, patient immunodéprimé, patient âgé fragile	J0* ----->	J+10 ----->	J+24 -----> Sortie
	Précautions complémentaires GOUTTELETTES et CONTACT	Maintien des Précautions Gouttelettes et Contact	Précautions standard Maintien des gestes barrière
		↑ Transfert possible vers SSR, ou SLD ou EHPAD si absence de fièvre et de dyspnée depuis au moins 48H. Pas de PCR avant transfert**.	
Patient hospitalisé en MCO	J0* ----->	J+8 ----->	J+14 -----> Sortie
	Précautions complémentaires GOUTTELETTES et CONTACT	Maintien des Précautions Gouttelettes et Contact	Précautions standard Maintien des gestes barrière
		↑ Transfert vers SSR possible si absence de fièvre et de dyspnée depuis au moins 48H. Pas de PCR avant transfert**.	
	Si sortie domicile avant J+8 : Eviction professionnelle jusqu'à J+8 et au moins 48h après amélioration des symptômes. Maintien des gestes barrière.		
Découverte fortuite chez un patient non-immunodéprimé, non symptomatique	J0* ----->	J+8 -----> Sortie	
	Précautions complémentaires GOUTTELETTES et CONTACT	Précautions standard Maintien des gestes barrière	
Découverte fortuite chez un patient immunodéprimé, non symptomatique	J0* ----->	J+10 -----> Sortie	
	Précautions complémentaires GOUTTELETTES et CONTACT	Précautions standard Maintien des gestes barrière	

Ré hospitalisation d'un patient avec antécédent de COVID-19 : pas d'indication à une PCR systématique

o Si ré hospitalisation < 14 jours après début des symptômes, (24 jours si immunodéprimé) : mettre en précautions gouttelettes et contact

o Si ré hospitalisation > 14 jours après début des symptômes (24 jours si immunodéprimé) :

- Si asymptomatique : précautions standard et mesures barrière COVID-19

- Si symptômes évocateurs de COVID-19 : refaire PCR (Cf. algorithme SFM) + Précautions complémentaires gouttelettes et contact + avis EOH + avis infectieux

* J0 = date de début des symptômes ou, si inconnue, date de la 1^{ère} PCR positive ou, si inconnue, date d'entrée en réa

** Sauf si transfert nécessaire avant les délais requis : si charge virale élevée (≤ 33, cf. algorithme SFM), transfert non autorisé