

FICHE ETUDE

Titre	Impact d'un protocole de dépistage, intervention brève et aide au sevrage tabagique lors d'une consultation aux urgences
Acronyme	PROSCEED
Investigateur coordonnateur	Dr Anne-Laure PHILIPPON – APHP Pitié Salpêtrière
Responsables scientifiques	Pr Yonathan FREUND – APHP Pitié Salpêtrière Dr Judith LEBLANC – APHP Saint-Antoine
Promoteur	APHP
Financement	INCa - IReSP
N° Clinical Trial	NCT05552534
Typologie	RIPH 2 prospective randomisée
Objectif principal	Evaluer la faisabilité d'une intervention d'aide au sevrage tabagique aux urgences de type STIR (Screening, Treatment Initiation and Referral) et son efficacité trois mois après l'intervention
Objectifs secondaires	- Evaluer la faisabilité du protocole : proportion de patients qui ont participé aux consultations de suivi à 7 jours et 1 mois, modalités de réalisation de l'inclusion, de l'intervention et des 3 consultations de suivi, professionnels impliqués - Evaluer la faisabilité de mesure du monoxyde de carbone expiré et corrélation avec la déclaration de sevrage. - Évaluer l'efficacité de l'intervention d'aide au sevrage tabagique à 7 jours et 1 mois - Evaluer le nombre de cigarettes fumées à 7 jours, 1 mois et 3 mois - Evaluer l'adhésion des patients et des équipes à l'intervention - Décrire l'adhésion des patients à l'intervention selon des sous-groupes (âge, genre, caractéristiques socio-économiques et motifs de recours)
Nombre de centres participants	3
Nombre de patients à inclure	152
Déroulement de l'étude	Durée de la période d'inclusion : 3 mois Durée de participation des patients : 3 mois Durée totale de l'étude : 8 mois
Critères d'inclusion	- Age ≥ 18 ans - Fumeur actif défini par le fait d'avoir fumé au moins 100 cigarettes au total dans sa vie, associé à une consommation quotidienne ou hebdomadaire - Consentement libre et éclairé signé par le patient - Patient ayant une compréhension de la langue française lui permettant de participer à l'intervention le cas échéant
Critère de non inclusion	- Tri IOA 1, urgence vitale absolue - Femme enceinte ou allaitante - Contre-indication à la prise de nicotine